

Normen voor rauwe melk

koemelk	norm	Frequentie
kiemgetal	geometrisch gemiddelde \leq 100.000 over twee maanden*	minimaal 2 per maand
celgetal	geometrisch gemiddelde \leq 400.000 over drie maanden*	minimaal 1 per maand
Antimicrobiële middelen	geen overschrijding conform (EEG) nr. 2377/90 bijlage I en II*	minimaal 2 per maand
<i>Onderzoek op overige residuen en contaminanten met een op basis van risicoanalyse gebaseerde frequentie.*</i>		
andere diersoorten	norm	Frequentie
kiemgetal	geometrisch gemiddelde \leq 1.500.000 over twee maanden*	minimaal 2 per maand
Antimicrobiële middelen	geen overschrijding conform (EEG) nr. 2377/90 bijlage I en II*	minimaal 2 per maand
<i>Onderzoek residuen en contaminanten met een op basis van risicoanalyse gebaseerde frequentie.*</i>		
<i>* Bij overschrijding moeten aantoonbaar corrigerende maatregelen zijn genomen door de melkveehouder en melding van de overschrijding heeft plaatsgevonden bij het COKZ.</i>		
<i>Het melkveehouderijbedrijf informeert u proactief over de status ten aanzien van tuberculose of brucellose. Uw bedrijf heeft toestemming nodig van het COKZ om melk te mogen verwerken van een melkveehouderijbedrijf (koemelk) die is verdacht van tuberculose of brucellose. De melk moet na pasteurisatie een fosfasetest ondergaan, de reactie moet negatief zijn.</i>		